

Patientinformation Rh-profylax

Information till dig som är RhD-negativ.

Analys av ditt blodprov som togs på Barnmorskemottagningen har visat att du är RhD-negativ. I samband med inskrivningen togs därför ett blodprov som visar att ditt väntade barn är RhD-positivt. När du som kvinna är RhD-negativ och bär på ett RhD-positivt barn innebär det att det finns en liten risk att du under graviditeten kan bilda antikroppar mot barnets röda blodkroppar, det kallas RhD-immunisering. Detta sker framför allt under sista tredjedelen av graviditeten. Svenska och internationella vetenskapliga data har visat att denna risk kan minskas betydligt genom att ge en extra förebyggande spruta med Rh-profylax under den perioden.

Du rekommenderas därför denna förebyggande behandling. Sprutan ges i skinkmuskeln och behandlingen är i princip helt riskfri både för dig och ditt väntade barn. Den risk som finns är en allergisk reaktion i samband med att sprutan ges. Denna biverkan är mycket ovanlig men eftersom det finns en liten risk kommer du får kvarstanna på mottagningen ca 30 minuter efter given spruta.

Samtliga RhD-negativa gravida kvinnor i Region Kronoberg som väntar ett RhD-positivt barn rekommenderas denna förebyggande behandling.

Din barnmorska tar ett blodprov i cirka graviditetsvecka 27 innan Du kan få sprutan. Sprutan ges i graviditetsvecka 28-30 på din Barnmorskemottagning.

Du kommer att få ytterligare en spruta med Rh-profylax efter förlossningen.